

HARMONIZAÇÃO DA ESTÉTICA DO SORRISO ATRAVÉS DO RECONTORNO COSMÉTICO DOS CANINOS SUPERIORES EM INCISIVOS LATERAIS UTILIZANDO RESINA COMPOSTA- RELATO DE CASO

Amanda Fonseca Naves¹
Livia Beatriz Almeida e Silva²
Isabella Mota Rocha³
Hellen Haarengl Vieira⁴
Sabrina De Sousa Moura⁵
Nathália Souza Mendes⁶
Eliza Souza Dias⁷
Sarah Maria Amorim Gomes Honorato⁸
Ana Julia Sena Borges⁹
Maria Heloísa Alves Cardoso¹⁰
Kamilla Moreira De Paula¹¹
Ester Severich Franco¹²
Nayane Nathyelly Rodrigues Cavalcante¹³
Heyde Esther Luz Oliveira¹⁴
Giovana Zanini Silva¹⁵
Ygor Santos Oliveira¹⁶
Natália Batista Caiado¹⁷
Gustavo Henrique Rezende¹⁸
Júlia Boaventura Teixeira Brzezinski Cunha¹⁹
Milena Dos Santos Ferreira²⁰
Vyctor Emmanuel Barce Alves²¹
Gabriella De Oliveira Avelar²²
Gabriella Bigi Coutinho²³
Caroline Martins De Andrade²⁴
Karen Silva Marques²⁵
Helloísa Christina Da Cunha Oliveira²⁶
Isabela Rezende Carvalho²⁷
Isabela Do Carmo Souza Oliveira²⁸
Luciana Carvalho Boggian²⁹
Juliane Guimarães De Carvalho³⁰
Pollyana Sousa Lôbo El Zayek³¹
Ana Lúcia Machado Maciel³²
Universidade Evangélica De Goiás – Unievangélica¹⁻³²

RESUMO

Introdução: O conceito de beleza na sociedade moderna tornou-se mais criterioso e preciso. A constante busca pelo sorriso perfeito acelerou o desenvolvimento da indústria odontológica em tecnologias para o aperfeiçoamento dos materiais restauradores, a fim de se reproduzir o mais fielmente possível a estrutura dental. Queixas de inconformidade com alterações de cor, apinhamentos, diastemas, fraturas, anomalias de forma, tamanho e posição são uma constante nos consultórios odontológicos. **Objetivo:** Este trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico de reanatomização de caninos superiores, que trouxe resultados estéticos bastante favoráveis. **Relato do caso:** Paciente LSC, 24 anos, sexo feminino, compareceu à Clínica Odontológica do Centro Universitário de Anápolis-

UniEVANGÉLICA com queixa principal de que “suas presas” a incomodavam, porque eram muito “pontudas”. No exame clínico intrabucal constatou-se que os caninos superiores apresentavam forma de lança bastante afilada e pontiaguda, mostrando evidente espaço nas ameias incisais. O tratamento proposto foi a realização de clareamento dental, seguido da reanatomização dos caninos superiores com resina composta, diminuindo os espaços das ameias incisais. **Conclusões:** A associação com o clareamento dental foi essencial para a obtenção de um sorriso harmônico, observando-se o protocolo correto baseado nas evidências apresentadas na literatura, sendo que o resultado atendeu às expectativas estéticas da paciente.

Palavras-chave: Resinas Compostas; Estética dentária; Autoimagem; Dente canino.

INTRODUÇÃO

Com a estética supervalorizada, influenciada por pessoas e pela mídia, cada vez mais aumenta a procura por procedimentos estéticos que visam a naturalidade e a harmonia 2; 4; 5. Os padrões estéticos da sociedade atual regem majoritariamente por um sorriso perfeito, com dentes brancos e alinhados 3; 4, influenciado diretamente pelos dentes anterossuperiores 3; 5. O sorriso pode interferir na autoestima, na autoconfiança e no convívio social dos indivíduos 4.

É indiscutível que variações do normal ou anomalias de forma, cor, número, textura, principalmente dos dentes anteriores, podem ter uma repercussão negativa na qualidade de vida das pessoas 2; 5. Para recuperar a estética, os cirurgiões-dentistas precisam avaliar cada caso, a fim de traçar um plano de tratamento individualizado, podendo lançar mão de procedimentos variados, desde técnicas minimamente invasivas, até as invasivas, a depender do grau de complexidade da anomalia 2; 3.

A agenesia dentária é uma anomalia relacionada ao número dos dentes, sendo a ausência completa de um ou mais dentes, podendo estar presente na dentição decídua ou permanente. A etiologia mais aceita é a genética, embora outros fatores podem estar envolvidos. A prevalência é maior nas pessoas do gênero feminino, e pode acontecer nos dentes: terceiros molares, incisivos laterais e pré-molares, da maior para a maior frequência. Podem vir como consequências da agenesia diastemas e alterações na posição dos dentes (1; 3).

As pessoas acometidas por agenesias têm uma motivação para a busca de uma resolução estética, por se sentirem incomodados com esta alteração. É necessária uma avaliação e um exame clínico e radiográfico, para que se planeje como será feito o tratamento, levando em consideração a estética e a função, pois

pode ter várias abordagens, como correção ortodôntica, implantes, ou recontorno estético com resina composta (1; 3)

Dentre os procedimentos que utilizam técnica minimamente invasiva, as resinas compostas com seus sistemas adesivos permitem reproduzir o mais fielmente possível a forma e a textura dos dentes de maneira segura, têm ótima relação custo-benefício, alcançando resultados estéticos excelentes (1; 2; 5). A técnica de reanatomização com resina composta é um procedimento conservador, na maioria das vezes realizada sem desgaste da estrutura dental, reabilitando e reproduzindo a forma e o tamanho do dente (5). Assim sendo, a resina composta na técnica direta é uma opção viável e deve ser a primeira escolha para as transformações cosméticas. O profissional precisa ter conhecimento do material e da técnica restauradora, aliando habilidade e senso clínico, para devolver a naturalidade estética do sorriso (1; 2).

RELATO DE CASO

Paciente do gênero feminino, compareceu à Clínica Odontológica da UniEVANGÉLICA com queixa principal de que “suas presas estavam muito na frente e a incomodavam”. No exame intrabucal constatou-se que os caninos superiores (13 e 23) estavam mesializados, pela ausência clínica dos dentes 12 e 22. A radiografia panorâmica confirmou a agenesia bilateral dos incisivos laterais superiores. O plano de tratamento proposto foi a reanatomização dos caninos superiores em incisivos laterais superiores, utilizando resina composta na técnica direta.

Na próxima sessão, fez-se a seleção da cor A2 através da escala Vita, e da resina composta Herculite Esmate e Dentina (Dentsply). Foi colocado o isolamento absoluto dos dentes 15 ao 25, com dois grampos nas extremidades, e realizadas amarras com fio dental nos dentes 13, 11, 21, 23 e 24. Nenhum desgaste foi realizado na estrutura dental.

Seguiu-se com o protocolo clínico, na sequência: condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30” no esmalte, seguido de lavagem pelo dobro do tempo e secagem. A aplicação do sistema adesivo convencional de dois passos Prime & Bond (Dentsply) foi feita em duas camadas, seguidas de jato de ar, e a fotopolimerização da última camada por 20”.

A guia de silicona foi adaptada do lado palatino para ser adicionada a primeira camada da resina composta Herculite Esmate (Dentsply) para iniciar o formato do dente do lado lingual. Seguiu-se com a Herculite Dentina A2 (Dentsply) para o corpo da restauração, e finalizando a superfície vestibular com a Herculite Esmalte A2 (Dentsply), sendo polimerizada cada camada adicionada, até se obter o formato dos incisivos laterais superiores. Um acabamento inicial foi realizado após o recontorno cosmético, detalhando a forma dos dentes e alisando a resina composta. Após a remoção do isolamento absoluto, checkou-se a oclusão com um carbono para articulação, ajustando-se os contatos.

O acabamento e o polimento finais foram executados na sessão seguinte, utilizando pontas diamantadas finas e extrafinas, seguida de pontas de borracha abrasiva para polimento de resina composta, discos sequencias de abrasividade decrescente, e por último, disco de feltro com pasta para polimento de resina POLI I e POLI II (Kota), finalizando a transformação dos caninos superiores em incisivos laterais superiores.

CONCLUSÃO

A técnica de restaurações diretas para os recontornos cosméticos dever ser a preferível, por ser minimamente invasiva, apresentar ótima relação custo-benefício, proporcionar excelentes resultados estéticos, com longevidade satisfatória, restabelecendo a harmonia estética. O profissional precisa estar habilitado a realizar os procedimentos propostos, seguindo o protocolo restaurador, para proporcionar os resultados propostos ao paciente, levando ao sucesso da técnica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Silva PKS, Bento M, Monteiro GQM, Durão MA. Resina composta direta no recontorno estético de caninos em caso de agenesia de incisivos laterais: relato de caso. Revista UNINGÁ. 2021;58:eUJ3093-3.
- Abreu SC, Isabel CAC. Reanatomização em dentes anteriores com resina composta: Relato de caso. Arquivo Brasileiro de Odontologia. 2020;16(1):15-19.
- França F, Botton LMS, Junqueira-Mendes CHZ, Mendes LM et al. Tratamento da agenesia bilateral de incisivos laterais superiores com fechamento dos espaços: uma revisão de literatura. J Multidiscipl Dent. 2021;11(2):86-91.

Malta DBJ, Souza GG, Lopez JGA, Pires MD et al. Reanatomização do sorriso com uso de resina composta: relato de caso. e-Acadêmica. 2022;3(3); e4933341.

Detogni AC, Piana EA, Gadonski AP, Camilotti V. Reanatomização dental pela técnica direta com guias de silicone. Clinical and Laboratorial Research in Dentistry [Internet]. 2020. Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/Reanatomiza%C3%A7%C3%A3o-dental-pela-t%C3%A9cnica-direta-com-guias-Detogni-Piana/72582343a63bf477b54a808a8dfb93bc32f60519>