

## **Categoria**

Pôster (UniEVANGÉLICA-Anápolis)

## **TAXA DE VAGINOSE BACTERIANA EM PACIENTES ATENDIDAS PELO SUS NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO**

Camila Silva; João Diego Dias Assunção; Victor Rodrigues Santos; Kelly Deyse Segati; Nathália Machado Seixo de Britto

Tema: A vaginose bacteriana é caracterizada como uma síndrome que resulta de um supercrescimento da microbiota vaginal anaeróbia obrigatória ou facultativa da vagina, sendo comum o isolamento de *Gardnerella vaginalis*. Na maioria dos casos a vaginose bacteriana não causa grandes complicações, embora alguns autores a associem ao parto prematuro. Objetivo: Calcular a taxa de vaginose bacteriana em pacientes atendidas pelo SUS na cidade de Anápolis-GO. Metodologia: foram levantados laudos citológicos de cérvix uterina pelo método de Papanicolaou durante o ano de 2013, utilizando os dados de domínio público contidos no SISCOLO e realizadas análises estatísticas pelo programa OPENEPI versão 4.1. Resultados: Os dados analisados revelaram a prevalência de 20,4% (3738/18247) de casos de diagnóstico compatível com bacilos supracitoplasmáticos sugestivos de *Gardnerella vaginalis*. Conclusão: Embora o quadro de vaginose bacteriana tenha sido um evento baixo na população de estudo, esta prevalência está em acordo com outros trabalhos realizados no Brasil (20-40%).

**Palavras Chave:** Citopatologia; Vaginose Bacteriana; Exame de Papanicolaou; *Gardnerella Vaginalis*