

Categoria
Pôster (UniEVANGÉLICA-Anápolis)

VACINA PREVENTIVA CONTRA CÂNCER DO COLO DE ÚTERO: QUEM PODE SER VACINADO?

Daniela da Silva Pena; Laís Pimentel Florentino Ferreira; João Diego Dias Assunção; Victor Rodrigues Santos; Gabriela Carolina Lopes; Bruna Mendes Marchiori; Kelly Deyse Segati

Tema: Muito se tem discutido no cenário brasileiro sobre a vacinação em massa. Vacinas profiláticas contra HPV foram desenvolvidas objetivando reduzir a infecção e incidência do câncer do colo de útero. Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico para responder as dúvidas mais frequentes em relação à vacinação contra o vírus HPV. Metodologia: realizou-se um levantamento de 15 artigos sobre a vacina contra o HPV, a fim de investigar qual o público alvo para o esquema de vacinação. Resultado: A idade sugerida para vacinação na maioria dos estudos é de 11 e 12 anos. O estudo indicou que há possibilidade de iniciar o esquema vacinal a partir dos 9 anos. Outro ponto interessante é que mulheres de 13 a 26 anos que não foram imunizadas no período preconizado pelo Ministério da Saúde e ainda não tenham experiências sexuais podem ser beneficiadas. Já mulheres que iniciaram vida sexual, quando vacinadas apresentam proteção reduzida. Grávidas não podem ser vacinadas. A vacina também pode ser administrada em meninos tendo como principal benefício a prevenção das verrugas genitais. Conclusão: A eficiência da vacinação em massa em meninas que ainda não iniciaram a atividade sexual, no futuro acarretará na redução das taxas de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil.

Referências: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de vigilância das doenças transmissíveis. Coordenação geral do Programa

de Nacional de Imunizações. Informe técnico sobre a vacina contra o papilomavírus humano (HPV). Brasília: Dez 2013.

Palavras Chave: HPV; Vacina; Câncer do Colo de Útero; Faixa Etária