



PERCEPÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ACERCA DOS FATORES QUE INTERFEREM NA PREVALÊNCIA DAS ÚLCERAS DE PRESSÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.

Bianca Royer Weschenfelder¹
Cecília Magnabosco Melo¹
Lara de Castro Ávila¹
Ludmila Souza da Silveira¹
Millena Luíza Silva¹
Samara Lamounier S. Parreira²
Fernanda Bastos Souza²

O presente trabalho tem por objetivo propor uma metodologia de pesquisa que identifique os fatores que interferem no aparecimento de úlceras de pressão na unidade de terapia intensiva. Tratar-se-á de um estudo experimental, quantitativo, transversal e analítico a ser realizado na UTI de um hospital de urgências localizado no município de Anápolis-Goiás. Constituem-se como participantes da pesquisa profissionais da equipe multidisciplinar: fisioterapeutas, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do referido hospital, que possuem vínculo empregatício por ao menos seis meses de trabalho na UTI do mesmo. O questionário apresentará 16 perguntas fechadas com alternativas de resposta e 2 perguntas abertas, acerca do tema do presente trabalho. Acredita-se que embora seja claro a atribuição de cada membro da equipe multidisciplinar em relação ao seu papel na prevenção de úlceras de pressão, ainda existe uma deficiência na comunicação entre esses profissionais, seja através de comunicação oficial (prontuário) ou através de comunicação verbal. Espera-se que a investigação e identificação dos fatores associados ao aparecimento de úlcera de pressão contribuam com resultados científicos que subsidiem o enfrentamento pelos profissionais de saúde às problemáticas encontradas, e conseqüentemente os resultados contribuirão para que mediante esse enfrentamento, ocorra uma prevenção mais eficaz das úlceras de pressão e uma diminuição dos custos de tratamento.

Palavras-Chave: Úlceras de pressão. UTI. Equipe multidisciplinar.

PERCEPTION OF THE MULTIDISCIPLINARY TEAM ABOUT FACTORS INTERFERING PREVALENCE OF PRESSURE ULCES IN THE INTENSIVE THERAPY UNIT.

This paper aims to propose a research methodology that identifies the factors that interfere with the appearance of pressure ulcers in the intensive care unit. This will be an experimental, quantitative, cross-sectional and analytical study to be performed in the ICU of an emergency hospital located in the municipality of Anápolis-Goiás.

¹ Discente Fisioterapia UniEVANGÉLICA, Brasil. bibiroyer@hotmail.com

² Docente Fisioterapia Unievangélica, Brasil. magnabosco.cecilia@gmail.com

¹ Discente Fisioterapia UniEVANGÉLICA, Brasil. laraavila.16@gmail.com

¹ Discente Fisioterapia UniEVANGÉLICA, Brasil. ludysouza26@hotmail.com

¹ Discente Fisioterapia UniEVANGÉLICA, Brasil. millenaluiza29@gmail.com

² Docente Fisioterapia Unievangélica, Brasils. samaralamouniersp@gmail.com

² Docente Fisioterapia Unievangélica, Brasils. Bastos.fernanda@hotmail.com



XVII MOSTRA ACADÊMICA DO CURSO DE FISIOTERAPIA

11 de dezembro de 2019



The research participants are professionals from the multidisciplinary team: physiotherapists, doctors, nurses and nursing technicians, of the Intensive Care Unit (ICU) of the referred hospital, who have employment

for at least six months of work in the ICU of the said hospital. . It will present 18 closed and open questions, with alternative answers about the theme of the present work. It is believed that although it is clear the assignment of each member of the multidisciplinary team regarding the factors that interfere with the prevalence of pressure ulcers, there is still a deficiency in communication between these professionals, either through official communication (medical records) or through communication. verbal. And it is hoped that the investigation and identification of factors associated with the onset of pressure ulcers will contribute to scientific results that support the health professionals' coping with the problems encountered, and consequently the results will contribute to a more effective prevention through such coping. pressure ulcers and a reduction in treatment costs. **Conclusion:** It is concluded that there are insufficient materials in the literature that prove the real cause of the emergence of pressure ulcers in intensive care units and that this pre-project will bring contributions to the construction of the project to be performed.

Keywords: Ressure ulcer; ICU; multidisciplinary team.

1. Introdução:

Úlcera por pressão (UP) é definida como uma área de necrose tissular que é formada quando o tecido é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, por um determinado período de tempo. Essa pressão prejudica a circulação sanguínea favorecendo a morte celular e o aparecimento da úlcera. As lesões ocorrem principalmente nos pontos de maior descarga de peso como atrás da cabeça, nas costas, no quadril, nas nádegas e cotovelos (RIOS, 2016).

O trabalho desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) se configura como intenso e complexo por ter diversas necessidades no desenvolvimento do cuidado. Na busca por uma assistência de excelência a estes pacientes verifica-se a necessidade de uma equipe interdisciplinar quando desenvolvida os membros aplicam seus conhecimentos contribuindo efetivamente para um cuidado de qualidade, neste contexto se faz importante a atuação multiprofissional na UTI para a produção de ações de saúde frente à complexidade do processo saúde-doença. A comunicação compartilhada é um fator importante entre os membros da equipe interdisciplinar permitindo a troca de informações sobre as condições saúde/ doença do indivíduo objetivando adotar condutas corretas de acordo com a necessidade individual de cada paciente (NEGREIROS, 2017; FUSSINGER, 2019).

A interdisciplinaridade é uma nova maneira de ver o cuidado considerando os diversos fatores envolvidos nos agravos à saúde nesta perspectiva busca-se a produção da saúde é não só o tratamento para uma situação específica no hospital isto se torna ainda mais difícil, pois o cuidado com o paciente vem de uma soma de cuidados parciais que se complementam envolvendo ações de diversos cuidadores, além de toda a diversidade de rotinas e procedimentos (FUSSINGER, 2019).

Apesar dos avanços nos cuidados em saúde, as úlceras de pressão continuam sendo uma



XVII MOSTRA ACADÊMICA DO CURSO DE FISIOTERAPIA

11 de dezembro de 2019



importante causa de mortalidade, com impacto na qualidade de vida do paciente e de seus familiares, gerando um problema social e econômico. A prevenção é a melhor solução para o problema, sendo ela responsabilidade de toda equipe multidisciplinar. É necessário à atenção constante às alterações da pele, identificação dos pacientes de alto risco e atenção à mudança de decúbito de duas em duas horas para alívio da pressão, além de uma comunicação efetiva entre a equipe (SHEILA, 2010).

Considerando-se que os pacientes internados em uma UTI são vulneráveis ao desenvolvimento de lesões de pele e que há fatores de risco específicos como à falta de mobilidade, o índice de pacientes que desenvolvem úlceras de pressão em uma unidade de terapia intensiva (UTI) ainda é um fator recorrente devido à combinação de fatores extrínsecos e intrínsecos que corroboram para o surgimento das lesões. Um estudo realizado em uma UTI mostra que a incidência de úlceras por pressão é de 20,6% a 39,81%, fator que comprova a necessidade de atenção constante da equipe de saúde, com intuito de diminuir o risco de desenvolvimento de uma UP (ANVISA, 2013; CONSTANTIN, 2018).

Portanto, o presente trabalho tem por objetivo propor uma metodologia de pesquisa que identifique os fatores que interferem no aparecimento de úlceras de pressão na unidade de terapia intensiva na percepção dos membros da equipe responsável pelo cuidado.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo experimental, quantitativo, transversal e analítico a ser realizado na UTI de um hospital do Hospital Urgências localizado no município de Anápolis-Goiás. A amostra se caracterizará por conveniência e será composta por profissionais da equipe multidisciplinar: fisioterapeutas, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do referido hospital, que possuam vínculo empregatício por ao menos seis meses de trabalho na UTI do mesmo, e aceitarem participar da pesquisa por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Serão excluídos questionários incompletos e estagiários presentes no hospital.

O instrumento a ser utilizado compõe-se por um questionário estruturado, sugerido pelos autores. O questionário apresentará 16 perguntas fechadas com alternativas de resposta e 2 perguntas abertas, acerca do tema proposto. O questionário contemplará os seguintes eixos: conhecimento dos profissionais sobre os fatores determinantes das úlceras de pressão; percepção sobre o papel da comunicação na prevenção das úlceras de pressão; desafios encontrados na prática profissional. O estudo terá início somente após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, conforme resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os profissionais que aceitarem voluntariamente participar do estudo deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após concordância com a



XVII MOSTRA ACADÊMICA DO CURSO DE FISIOTERAPIA

11 de dezembro de 2019



participação na pesquisa e depois de sanadas todas as dúvidas, serão instruídos a responder uma entrevista estruturada. Será utilizado o ambiente hospitalar para a aplicação do questionário que será respondido pelos diferentes profissionais da equipe multidisciplinar em ambiente de trabalho conforme o horário de trabalho.

3. Resultados Esperados

Espera-se que a investigação e identificação dos fatores associados ao aparecimento de úlcera de pressão contribuam com resultados científicos que subsidiem o enfrentamento pelos profissionais de saúde as problemáticas encontradas, e consequentemente os resultados contribuirão para que mediante esse enfrentamento, ocorra uma prevenção mais eficaz das úlceras de pressão e uma diminuição dos custos de tratamento. Acredita-se que embora seja claro a atribuição de cada membro da equipe multidisciplinar em relação aos fatores que interferem na prevalência de úlceras de pressão, ainda existe uma deficiência na comunicação entre esses profissionais, seja através de comunicação oficial (prontuário) ou através de comunicação verbal.

4. Referências

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Protocolo para prevenção de úlcera por pressão**. Brasília: Out. 2017

BANDEIRA CLJ; FUSSINGER L; KINALSKI SL; OLIVEIRA CC. O atendimento da equipe multiprofissional na Terapia Intensiva. **Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas**, v. 3, n. 1, p.101-108, 2019

CONSTANTIN AG; MOREIRA APP; OLIVEIRA JLC; HOFSTÄTTER LM; FERNANDES LM. Incidência de lesão por pressão em unidade de terapia intensiva para adultos. ESTIMA, **Brazilian Journal Enterostomal Therapy**, São Paulo, v.16, p.e1118, 2018.

NEGREIROS FDS; PEQUENO AMC; GARCIA JHP; AGUIAR MIF; MOREIRA TR; FLOR MJN. Percepção da equipe multiprofissional sobre as competências do enfermeiro no transplante hepático. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70, n. 2, p.258-64, 2017.

RIOS BL; OLIVEIRA JSF; TORRES MT; SOUZA NO; MARQUES PF; REIS UOP. Prevenção de úlceras por pressão em unidade de terapia intensiva: um relato de experiência. **Revista de Enfermagem da UFPE on line.**, Recife, v. 10, Supl. 6, p. 4959-64, dez., 2016.

SHEILA RL; LOPACINSKI AC; FRAGA R; URBAN CA. Úlceras de Pressão. **Geriatrics & Gerontology**, v. 4, n.1, p. 36-43, 2010.