

PADRÃO DE LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA DO CÂNCER COLORRETAL NO BRASIL NAS ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS

Evellyn de Andrade Pullig¹, Gabriel Garcia Cunha Lopes¹, Geraldo Porto Magalhães Netto¹, Juliana Moreira Ribeiro¹, Larissa Amorim Silva¹, Nathália Lima de Moraes Moruê¹, Tiago Arantes Pereira²

1. Discente do Curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA
2. Docente do Curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA

RESUMO: O câncer colorretal é considerado a terceira neoplasia mais frequente no mundo, e a quarta com mais índice de mortalidade. No Brasil, representa a terceira neoplasia mais prevalente nas mulheres, e o quarto mais incidente nos homens. O presente estudo tem como objetivo estudar o padrão de localização anatômica desse câncer no país, nas últimas duas décadas, a fim de tentar compreender os possíveis fatores que levaram a esse padrão, e sugerir as possíveis implicações clínicas e socio-epidemiológicas relacionadas com resultados encontrados. Nesse sentido, visa também contribuir para o processo de elaboração de estratégias de promoção de saúde no país, processo esse fundamental para sucesso das medidas de redução de morbimortalidade das doenças. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, observacional e quantitativo, em que os dados foram obtidos por meio de consulta à base de dados do Registro de Câncer de Base Populacional disponibilizada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). Nesse contexto, será utilizada bibliografia recente sobre o assunto para correlacionar com o padrão de localização anatômica dos cânceres de colorretal no Brasil.

Palavras-chave:
Câncer de Colorretal.
Localização Anatômica.
Prognóstico.